

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ АВЕКСИМА

Регистрационный номер:
ЛСР-006128/08

Торговое наименование: УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ АВЕКСИМА

**Международное непатентованное
или группировочное наименова-
ние:** активированный уголь

Лекарственная форма: таблетки

Состав

1 таблетка содержит:

действующее вещество: уголь акти-
вированный – 250 мг;

вспомогательное вещество: крах-
мал картофельный – 47 мг.

Описание: таблетки черного цвета,
плоскоцилиндрические с фаской
или с фаской и риской, слегка шеро-
ховатые.

Фармакотерапевтическая группа:
энтеросорбирующее средство.

Код АТХ: А07ВА01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает энтеросорбирующее,
дезинтоксикационное и противо-
диарейное действие. Относится к
группе поливалентных физико-хи-
мических антидотов, обладает боль-
шой поверхностной активностью.
Адсорбирует яды и токсины из же-
лудочно-кишечного тракта до их
всасывания, в том числе алкалоиды,
гликозиды, барбитураты и другие
снотворные и наркотические сред-
ства, соли тяжелых металлов, токси-
ны бактериального, растительного,
животного происхождения, произ-
водные фенола, синильной кислоты,
сульфаниламиды, газы. Препарат
адсорбирует также избыток неко-
торых продуктов обмена веществ
– билирубина, мочевины, холесте-
рина, а также эндогенные метаболиты,
ответственные за развитие
эндогенного токсикоза. Слабо ад-
сорбирует кислоты и щелочи (в том
числе соли железа, цианиды, метанол,
этиленгликоль). Не раздражает
слизистую оболочку желудочно-ки-
шечного тракта.

Фармакокинетика

Не всасывается, не расщепляется,
выделяется полностью через желу-
дочно-кишечный тракт в течение 24
часов.

Показания к применению

Экзогенные и эндогенные интокси-
кации различного происхождения
(в качестве дезинтоксикационного
средства).

В случае необходимости, пожалуй-
ста, проконсультируйтесь с врачом
перед применением лекарственно-
го препарата.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чув-
ствительность, язвенные пораже-
ния желудочно-кишечного тракта
(в том числе язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки,
язвенный колит), кровотечения из
желудочно-кишечного тракта, од-
новременное назначение антитоки-
сических лекарственных средств,
эффект которых развивается после
всасывания (в том числе метионин),
атония кишечника. Детский возраст
до 3 лет.

С осторожностью

Больным с сахарным диабетом и
лицам, находящимся на диете с
пониженным содержанием углево-
дов, беременность, период грудно-
го вскармливания, детский возраст
до 18 лет.

**Применение при беременности и в
период грудного вскармливания**

Прием препарата при беременно-
сти и в период грудного вскармли-
вания возможен только *после кон-
сультации и по назначению врача.*

Способ применения и дозы

Применяют внутрь в таблетках или
в виде водной взвеси измельчен-
ных таблеток, за 1-2 часа до или
после еды и приема других лекар-
ственных средств. Необходимое
количество таблеток размешивают
в 100 мл (1/2 стакана) охлажденной
кипяченой воды.

Взрослые - по 1-2 г 3-4 раза в сутки.
Максимальная разовая доза до 8 г.
Детям препарат назначают из рас-
чета 0,05 г/кг массы тела 3 раза в
сутки.

Максимальная разовая доза - до
0,2 г/кг массы тела.

Курс лечения при острых заболе-
ваниях составляет 3-5 дней, при
хронических заболеваниях - до 14
дней. Повторный курс - через 2 не-
дели по рекомендации врача.

При острых отравлениях лечение
начинают с промывания желудка с
использованием взвеси угля акти-
вированного, затем дают внутрь 20-
30 г препарата.

При метеоризме назначают внутрь
по 1-2 г 3-4 раза в сутки. Курс лече-
ния 3-7 дней.

Если после лечения улучшения не наступает в течение 24 часов или появляются новые симптомы, необходимо незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Диспепсия, запоры или диарея, окрашивание каловых масс в темный цвет. При длительном применении (более 14 дней) возможно снижение всасывания витаминов, кальция и других питательных веществ из желудочно-кишечного тракта.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не наблюдались.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Снижает всасывание и эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств.

Особые указания

При лечении интоксикаций необходимо создать избыток активированного угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации активированного угля в среде способствует десорбции связанного вещества и его всасыванию (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение активированного угля). Наличие пищевых масс в желудочно-кишечном тракте требует введения в высоких дозах, так как содержимое желудочно-кишечного тракта сорбируется активированным углем и его активность снижается. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и другие опиаты), необходимо применять активированный уголь в течение нескольких дней. При использовании препарата более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция. Пациентам с сахарным диабетом и

лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 47 мг углеводов (0,004 ХЕ).

Внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет на способность управлять транспортным средством и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания.

Форма выпуска

Таблетки, 250 мг.

По 10 или 12 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку.

1, 2, 3, 4, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Контурные безъячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование держателя (владельца) регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии

ОАО «Авексима»
125284, Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект,
д. 31А, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 258-45-28.

Производитель

ООО «Авексима Сибирь»
652473, Россия, Кемеровская обл.,
г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д. 7.
Адрес производства:
Кемеровская обл.,
г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д. 7.